

BLINKER 400 mg

USO VETERINARIO

Cada tableta contiene:

Fluralaner	400 mg
Excipientes c.s.p.	2500 mg

INDICACIONES

Actúa eficazmente en el control y tratamiento de infestaciones por pulgas, piojos, garrapatas y ácaros causantes de la sarna en caninos. La rápida absorción del fluralaner por nivel intestinal permite la eliminación de los ectoparásitos a partir de las 8 horas posteriores a la administración del producto. Su acumulación principalmente a nivel graso y hepático, permiten una liberación permanente hacia el torrente sanguíneo, prolongando el efecto antiparasitario por aproximadamente 4 a 5 semanas.

Blinker brinda protección indirecta contra la transmisión de *Babesia canis*, *Anaplasma platys* y *Ehrlichia canis* e infestaciones de *Dipylidium caninum*. Además, puede usarse como terapia de apoyo en el tratamiento de la dermatitis alérgica por pulgas.

ADMINISTRACION

Vía oral.

ESPECIES Y DOSIS

Cada tableta está destinada para tratar caninos mayores de 8 semanas, con un peso >20 a 40 kg de peso, equivalente a 10 – 20 mg de fluralaner / kg.

ADVERTENCIAS

BLINKER 400 mg posee un amplio margen de seguridad y administrado en la dosis, frecuencia y vía recomendada no genera efectos adversos.

- Utilizar las dosis recomendadas.
- Administrar el producto después del consumo de alimento, para mejorar la absorción de su principio activo.
- No administrar la tableta en caninos menores de 8 semanas.
- Realizar un adecuado control de los ectoparásitos en el medio ambiente, ayudara a evitar las infestaciones y reinfestaciones masivas.
- La administración de **Blinker 400 mg** puede provocar diarrea o vomito. De presentarse vómitos dentro de las 3 horas posteriores a la administración de la tableta, volver a dosificar el producto.
- Usarse con precaución en pacientes con antecedentes convulsivos u otros trastornos neurológicos ya que pueden potenciar la aparición de estos.
- No administrar en felinos.
- En todos los casos se recomiendan dosis únicas y repetir el tratamiento en base a la prevalencia de los parásitos en el lugar, la posibilidad de reinfestación o a criterio del Médico Veterinario.

- Almacenar en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 30°C, protegido de la luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

Ecuador Reg. No. XXXXXXXX

Elaborado por JAMES BROWN PHARMA C.A.

Av. Interoceánica Km 23 ½, Sector El Rosal, Pifo.

Telfs.: (593-2) 399-7000

www.jamesbrownpharma.com

Lote:

Elab:

Exp: